



Tè alle erbe per stomaco e intestino

Da bere dopo aver preparato un infuso di tè.
Rimedio vegetale in caso di disturbi gastrointestinali

Ambiti di applicazione:

Disturbi gastrointestinali come senso di pesantezza allo stomaco, flatulenze e leggeri disturbi spasmodici gastrointestinali; disturbi gastro-cardiaci di origine nervosa.

Controindicazioni:

Allergia verso l'anice e l'anelolo.

Interazioni:

Non sono note interazioni.

Posologia e modalità d'uso:

Versare ca. 150 ml. di acqua bollente su circa 1 cucchiaino colmo di tè, coprire e lasciare riposare per circa 10 minuti; setacciare con un colino da tè. Se non è stato prescritto altrimenti, bere una tazza di tè caldo, appena preparato, più volte al giorno tra i pasti.

Effetti collaterali:

Occasionalmente si verificano reazioni allergiche sulla pelle, alle vie respiratorie e nel tratto gastrointestinale.

Avvisi di effetti collaterali:

nel caso in cui notiate effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico o farmacista. Ciò vale anche per gli effetti collaterali, che non sono indicati nel seguente foglietto illustrativo. È anche possibile comunicare direttamente gli effetti collaterali riscontrati all'Istituto Federale per medicinali e prodotti medici, reparto Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, sito web: www.bfarm.de. Segnalando effetti collaterali indesiderati, contribuite alla messa a disposizione di ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Nota:

Conservare il farmaco lontano dalla portata dei bambini; proteggerlo dalla luce e dall'umidità.
Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Principi attivi:

100 g di tè contengono:

25 g di fiori di camomilla, 20 g di foglie di menta piperita, 15 g di anice, 15 g di finocchio dolce, 15 g di cumino.

Altri componenti: foglie di melissa, corteccia di cannella, fiori di calendula officinalis.

Dimensioni della confezione disponibile: 120 g di tè

Stato delle informazioni: gennaio 2016

N° art.: 7

Eti0817

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.

