



Pomata anti-callosità 10% di vasellina salicilata

Principio attivo: Acido salicilico

Per l'applicazione negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni

Istruzioni per l'uso: Informazioni per l'utente

Leggere attentamente ed in ogni sua parte il foglietto illustrativo prima di applicare il medicinale, poiché contiene informazioni importanti.

Applicare sempre il seguente medicinale come descritto in questo foglietto illustrativo e/o esattamente secondo le istruzioni del proprio medico, del farmacista o del personale medico di competenza.

- Conservare il foglietto illustrativo. Può essere utile per eventuali consultazioni successive.
- Per ulteriori consigli o informazioni consultare il proprio farmacista.
- Nel caso in cui notiate effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico, farmacista o al personale medico di competenza. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non siano riportati nel seguente foglietto illustrativo. Vedi il paragrafo 4.
- Nel caso in cui non si notino miglioramenti dopo 7 giorni di somministrazione o i sintomi dovessero peggiorare, rivolgersi al proprio medico.

Cosa contiene il presente foglietto illustrativo

1. Cos'è la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica e a cosa serve?
2. Che cosa si deve osservare prima di utilizzare la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica?
3. Come deve essere utilizzata la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica?
4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?
5. Come deve essere conservata la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica?
6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

1. Cos'è la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica e a cosa serve?

Aree di applicazione: formazione eccessiva di callosità (ipercheratosi), duroni (clavus), calli.

2. Cosa è indispensabile osservare prima di applicare la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica?

La pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica non deve essere utilizzata:

- in caso di ipersensibilità allergica verso l'acido salicilico o verso uno degli altri componenti di questo medicinale menzionato nel paragrafo 6.
- in caso di ipersensibilità da contatto,
- nei lattanti
- in caso di funzionalità renale limitata.

Avvertenze e misure precauzionali:

la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica non deve entrare in contatto con le mucose e gli occhi.

In caso di applicazione della pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica insieme ad altri farmaci:

Informare il proprio medico o farmacista se si utilizzano al momento altri medicinali, se si sono utilizzati di recente o se si è intenzionati ad utilizzarli nel prossimo futuro.

l'acido salicilico può rafforzare l'assimilazione di altri farmaci applicati sullo stesso punto. L'acido salicilico assunto dal corpo rallenta la decomposizione del metotrexato e rafforza l'effetto delle sostanze sulfaniluree.

Gravidanza, allattamento e capacità riproduttiva

Se siete incinte o state allattando, oppure se avete anche solo il sospetto di una gravidanza o state provando a rimanere incinte, prima di applicare questo medicinale consultate il vostro medico o farmacista.

Non applicare in gravidanza. Durante l'allattamento non applicare nella zona del seno. Per il trattamento dei calli, utilizzare solo per aree fino a 5 cm².



3. Come deve essere utilizzata la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica?

Applicare sempre il seguente medicinale come descritto in questo foglietto illustrativo e/o esattamente come concordato con il proprio medico, farmacista o personale medico di competenza. In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico, farmacista o al personale medico di competenza.

La dose giornaliera consigliata è: applicare sulla pelle 1-2 volte al giorno.

Dose giornaliera massima per gli adulti: meno di 20 g (meno di 2 g di principio attivo).

Dose giornaliera massima per gli adolescenti a partire dai 12 anni: massimo 2 g (meno di 0,2 g di principio attivo).

Modo di applicazione: da applicare sulla pelle.

Durata del trattamento: non utilizzare per più di una settimana.

Nel caso in cui abbiate ulteriori domande da porre relativamente all'applicazione di questo medicinale, rivolgetevi direttamente al vostro medico, farmacista o al personale medico di competenza.

4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?

Come tutti i medicinali anche questo farmaco può avere effetti collaterali che, tuttavia, non devono necessariamente manifestarsi in tutti i soggetti.

Nei punti in cui è stata applicata la pomata anti-callosità si possono presentare irritazioni cutanee.

In casi molto rari può comparire un'ipersensibilità precedentemente non nota (sensibilizzazione al contatto) verso l'acido salicilico.

Avvisi di effetti collaterali

Nel caso in cui notiate effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico, farmacista o al personale medico di competenza. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non siano riportati nel seguente foglietto illustrativo. E' anche possibile comunicare gli effetti collaterali direttamente all'Istituto Federale per i Farmaci e Prodotti Medici, reparto di Vigilanza farmacologica, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, sito web: www.bfarm.de. Segnalando gli effetti collaterali indesiderati si contribuisce alla messa a disposizione di ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come deve essere conservata la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica?

Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare questo farmaco dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o sul tubetto "Da utilizzare entro il". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Condizioni di conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non smaltire il medicinale nell'acqua di scarico (per es. nel WC o lavandino). Per informazioni relative allo smaltimento corretto del medicinale, rivolgersi al proprio farmacista. In questo modo contribuite a tutelare ambientale. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente sito: www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

1 g di pomata contiene : Principio attivo: 0,1 g di acido salicilico.

Altri componenti: paraffina liquida, vasellina bianca.

Dimensioni della confezione disponibili: la pomata anti-callosità con il 10% di vasellina salicilica è disponibile nella confezione originale da 90 g.

Le presenti informazioni per l'uso sono state revisionate nel mese di luglio 2021.

PB0722

No. art: 894

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.