



## Spray medico per gola e faringe

Prodotto medico

La preghiamo di leggere attentamente il presente foglietto illustrativo che contiene informazioni importanti, da osservare per l'uso di questo medicinale. Per informazioni si rivolga direttamente al medico o al farmacista.

### Scopo d'utilizzo:

Lo spray medico per gola e faringe, grazie alle sue proprietà umettanti favorisce il ripristino di una funzione fisiologica normale e protettiva della mucosa orale e faringea.

Favorisce in modo del tutto naturale alla rigenerazione e/o ripristino di una mucosa orale e faringea fisiologicamente normale e protettiva.

### Composizione:

*Cosa contiene lo spray medico per gola e faringe?*

acqua purificata, estratto di muschio islandese (2,8 %), dexpanthenolo, soluzione salina Natursole (1,5 %), polisorbato 80, estratto di camomilla, solfato di zinco eptaidrato, benzoato di sodio, mentolo, olio di eucalipto, L-istidina idorcloruro monoidrato, acido citrico, acesolfato K, sorbato di potassio, acido sorbinico.

### Forma farmaceutica e contenuto:

*Cos'è lo spray medico per gola e faringe e per cosa viene applicato?*

Spray dosatore da 30 ml da spruzzare nella cavità orale e faringea.

### Ambito di applicazione:

*Quando utilizzare lo spray medico per gola e faringe?*

per favorire l'idratazione naturale mucosa orale e faringea:

- mal di gola e raucedine,
- tosse secca e voce rauca, dovuto alle mucose orale e faringea irritate.

### Controindicazioni:

*Quanto non è indicato utilizzare lo spray medico per gola e faringe?*

Non utilizzare lo spray medico per gola e faringe:

- se si è ipersensibili (allergici) verso uno dei componenti di questo prodotto medico, menzionati nella "Composizione",
- dopo operazioni, in caso di ferite o forti infiammazioni della gola o della faringe.

*È possibile utilizzare lo spray medico per gola e faringe durante la gravidanza e l'allattamento?*

Se siete incinte o state allattando, oppure se avete anche solo il sospetto di una gravidanza o state provando a rimanere incinte, prima di utilizzare questo prodotto medico, consultate il vostro medico o farmacista.

### Precauzioni per l'uso e avvertenze particolari:

Se utilizzato conformemente alle indicazioni, non sono necessarie particolari misure precauzionali.

Durante l'uso, tenere il flacone in posizione verticale davanti all'imboccatura aperta e premere la testa dello spruzzatore in modo rapido e deciso.

Non inalare durante l'uso del prodotto. Tenere presente che prima del primo utilizzo è necessario azionare più volte la pompetta.

Per motivi igienici, si raccomanda di pulire la testina di nebulizzazione con un panno pulito dopo ogni utilizzo. Per evitare eventuali contagi dell'infezione, il flacone spray dovrebbe essere utilizzato soltanto da una sola persona.

Non spruzzare negli occhi.

Per garantire la qualità ineccepibile del prodotto e la funzionalità del sistema d'applicazione per un lungo periodo, si raccomanda di non manipolare il flacone dosatore.

E' possibile che si depositino residui di prodotto, di cui si tiene conto nella quantità di riempimento.



La somministrazione ai bambini inferiori ai 12 anni dovrebbe essere effettuata solo sotto stretta sorveglianza da parte di un adulto.

#### **Interazioni con altre sostanze:**

Non sono note interazioni con altre sostanze.

#### **Effetti sulla guida e sull'uso di macchine:**

Non sono necessarie particolari misure precauzionali.

#### **Posologia, modalità e durata della somministrazione:**

*Quanto spesso e in quale quantità si può utilizzare lo spray medico per gola e faringe?*

Bambini a partire dai 6 anni d'età e adulti:

Spruzzare fino a 10 volte al giorno, secondo fabbisogno, 1-2 gocce (0,14 ml per spruzzo) nella cavità orale e faringea.

*Per quanto tempo si può utilizzare lo spray medico per gola e faringe?*

Se entro 4-7 giorni non si riscontra nessun miglioramento dei disturbi, è consigliabile chiedere il parere di un medico / e/o di un farmacista. All'occorrenza, è possibile applicare lo spray medico per gola e faringe fino alla scomparsa dei sintomi (max 30 giorni senza interruzione).

#### **In caso di sovradosaggio dello spray medico per gola e faringe:**

non sono noti avvelenamenti e manifestazioni da sovradosaggio.

#### **Quali sono i possibili effetti collaterali?**

Non si può escludere del tutto un leggero bruciore nella cavità orale e faringea.

In alcuni casi potrebbero verificarsi delle intolleranze verso gli ingredienti contenuti nello spray medico per gola e faringe.


La quantificazione non è valutabile sulla base dei dati disponibili.

#### **Avvisi di effetti collaterali/incidenti gravi:**

se si osservano effetti collaterali o un peggioramento dello stato di salute dovuti all'uso del prodotto medico, siete pregati di rivolgervi all'indirizzo indicato al punto "Produttore". Gli incidenti gravi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente. Ciò vale anche per gli effetti collaterali/incidenti gravi che non siano riportati nel seguente foglietto illustrativo.

Segnalando gli effetti collaterali indesiderati si contribuisce alla messa a disposizione di ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo prodotto medico.

#### **Indicazioni e avvertenze per la conservazione del medicinale:**

Lo spray medico per gola e faringe deve essere utilizzato solo entro la data indicata sul flacone e sulla scatola della confezione  "Da consumarsi entro".

Una volta aperto il flacone, non conservarlo oltre 6 settimane.

#### **Indicazioni per la conservazione:**

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C e inferiore a 5 C.

#### **Conservare fuori dalla portata dei bambini!**

**Stato dell'informazione:** febbraio 2022

PB1022

Nr. art: 248

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.