



Pomata per ferite e cicatrizzazioni

Pomata allo zinco

Principio attivo: 10 g di ossido di zinco in 100 g di pomata
Pomata da applicare sulla pelle

Leggere attentamente ed in ogni sua parte il foglietto illustrativo prima di applicare il medicinale, poiché contiene informazioni importanti.

Applicare sempre il seguente medicinale come descritto in questo foglietto illustrativo e/o esattamente secondo le istruzioni del proprio medico, del farmacista o del personale medico di competenza.

- Conservare il foglietto illustrativo. Può essere utile per eventuali consultazioni successive.
- Per ulteriori consigli o informazioni consultare il proprio farmacista.
- Nel caso in cui notiate effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico, farmacista o al personale medico di competenza. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non siano riportati nel seguente foglietto illustrativo. Vedi il paragrafo 4.
- Nel caso in cui non si notino miglioramenti dopo l'applicazione o i sintomi dovessero peggiorare, rivolgersi al proprio medico.

Cosa contiene il presente foglietto illustrativo

1. Cos'è la pomata per ferite e cicatrizzazioni e quando la si utilizza?
2. Cosa è indispensabile osservare prima di applicare la pomata per ferite e cicatrizzazioni?
3. Come si applica la pomata per ferite e cicatrizzazioni?
4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?
5. Come si conserva la pomata per ferite e cicatrizzazioni?
6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

1. Cos'è la pomata per ferite e cicatrizzazioni e quando la si utilizza?

Ambiti di applicazione:

Per favorire la guarigione delle ferite, anche per le ferite e screpolature umide e che provocano prurito.

2. Cosa è indispensabile osservare prima di applicare la pomata per ferite e cicatrizzazioni?

Non utilizzare la pomata per ferite e cicatrizzazioni,

- in caso di ipersensibilità allergica verso l'ossido di zinco o verso uno degli altri componenti di questo medicinale menzionato nel paragrafo 6.

Avvertenze e misure precauzionali:

Rivolgersi al proprio medico, al farmacista o al personale medico di competenza prima di applicare la pomata per ferite e cicatrizzazioni.

In caso di applicazione della pomata per ferite e cicatrizzazioni insieme ad altri medicinali

Informare il proprio medico o farmacista se si utilizzano al momento altri medicinali, se si sono utilizzati di recente o se si è intenzionati ad utilizzarli nel prossimo futuro.

Rimuovere completamente la pomata per ferite e cicatrizzazioni prima di applicare altri preparati topici (effetto limitato di altri preparati topici).

Gravidanza, allattamento e capacità riproduttiva

Se siete incinte o state allattando, oppure se avete anche solo il sospetto di una gravidanza o state provando a rimanere incinte, prima di applicare questo medicinale consultate il vostro medico o farmacista.

La pomata per ferite e cicatrizzazioni contiene cera di lana e alcool cetilstearyllico

La cera di lana e l'alcool cetilstearyllico possono causare irritazioni cutanee locali (per es. dermatiti da contatto).



3. Come si applica la pomata per ferite e cicatrizzazioni?

Applicare sempre il seguente medicinale come descritto in questo foglietto illustrativo e/o esattamente come concordato con il proprio medico, farmacista o personale medico di competenza. In caso di dubbi rivolgersi al proprio medico, farmacista o al personale medico di competenza.

La dose giornaliera consigliata è: applicare la pomata per ferite e cicatrizzazioni sulle aree cutanee interessate una o più volte al giorno e coprire con una garza.

Modo di somministrazione: da applicare sulla pelle.

Nel caso in cui abbiate ulteriori domande da porre relativamente all'applicazione di questo medicinale, rivolgetevi direttamente al vostro medico, farmacista o al personale medico di competenza.

4. Quali effetti collaterali possono presentarsi?

Come tutti i medicinali anche questo farmaco può avere effetti collaterali che, tuttavia, non devono necessariamente manifestarsi in tutti i soggetti.

Dopo l'applicazione della pomata per ferite e cicatrizzazione su aree cutanee molto infiammate, può verificarsi una leggera sensazione di bruciore. Occasionalmente possono verificarsi reazioni di intolleranza cutanea.

Avvisi di effetti collaterali:

nel caso in cui si notino effetti collaterali, rivolgersi direttamente al proprio medico o farmacista. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che non siano riportati nel seguente foglietto illustrativo. È anche possibile comunicare gli effetti collaterali direttamente all'Istituto Federale per i Farmaci e Prodotti Medici, reparto di Vigilanza farmacologica, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, sito web: www.bfarm.de.

Segnalando gli effetti collaterali indesiderati si contribuisce alla messa a disposizione di ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come si conserva la pomata per ferite e cicatrizzazioni?

Conservare il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare questo farmaco dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o sul tubetto "Da utilizzare entro il". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Condizioni di conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non smaltire il medicinale nell'acqua di scarico (per es. nel WC o lavandino). Per informazioni relative allo smaltimento corretto del medicinale, rivolgersi al proprio farmacista. In questo modo contribuite a tutelare ambientale. Ulteriori informazioni sono disponibili al www.bfarm.de/arnzeimittelentsorgung.

6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni

100 g di pomata per ferite e cicatrizzazioni contengono: Principio attivo: 10 g di ossido di zinco.

Altri componenti: vaselina bianca, paraffina densa, alcoli di cera di lana, alcool cetilico (Ph. Eur.).

Dimensioni della confezione disponibili: confezione originale con 100 g di pomata.

Le presenti informazioni per l'uso sono state revisionate nel marzo del 2022.

Contenuto 100 ml

PB0422

Nr. art.: 284

Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio farmacista.